

## 精神分裂症 陽性症狀與陰性症狀 一須知

陽性症狀是指：

- 妄想
- 幻覺
- 思維紊亂

在急性發作期間，這些症狀最為嚴重。

這些症狀通常伴有多疑症，病人對他人，尤其是對家人無端產生懷疑和不信任。

精神安定藥通常能對陽性症狀起作用。


令人遺憾的是，這並不適於所有病人。

病人服藥約 2 週後，藥物對陽性症狀所起的作用開始顯現，大約在 6 週後達到最佳效果。

若能定期服藥，病情復發返院率在 2 年內就可下降至 60% 左右。

請務必認識到，藥物並不能治癒這些症狀，如果停止服藥，陽性症狀又會出現。

對藥物產生反應的主要是陽性症狀。



陰性症狀是指：

- 行動能力下降
- 離群索居
- 無法或難以結交朋友
- 行動緩慢
- 心理脆弱，無法承受壓力
- 無法從以前的錯誤中吸取教訓
- 無法享受生活

大多數常用藥物都不能治療陰性症狀。

不管病人隔多長時間返回醫院治療，都是這種情況。

這會使親人的生活非常困難，因為這些症狀持續時間長，而且處於首次急性發作的病人中，約有一半都會出現這些症狀。

如果患有慢性精神分裂症，那麼不管服用什麼藥物，這些陽性和/或陰性症狀都會持續存在。對於某些精神分裂症病人來講，其自知力(理解並接受這種疾病)會產生波動。

現在有一些新藥，如：

- 氯氮平(Clozapine)
- 奧氮平(Olanzapine)
- 利培酮(Risperidone)
- 喹硫平(Quetiapine)
- 氨磺必利(Amisulpride)
- 阿利皮普利作爾 (Aripiprizole)

用這些藥物治療部份慢性精神分裂症非常有效。